

Direzione Professioni Sanitarie


Istruzione Operativa

Somministrazione terapia auricolare e oftalmica

INDICE

1.	SCOPO.....	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	TERMINOLOGIA.....	2
4.	RESPONSABILITÀ	2
5.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	2
6.	RIFERIMENTI.....	4

STATO DELLE REVISIONI

Rev	Data	Modifica	Redazione	Verifica contenuti e conformità norma UNI EN ISO 9001:2008	Approvazione
00	01/06/05	Prima emissione	CS Lidani	RQ M. Daminelli	DirDISTRO I.I.D. E. Capitoni
01	01/09/15	Adeguamento HPG23 Riunisce i contenuti ex IODISTRO33 IODISTRO34	RD C. Capelli 	RQ M. Daminelli 	DirDPS Dr.ssa S. Cesa 

1. SCOPO

Lo scopo di questa IO è di descrivere la sequenza delle attività svolte dall'OSS per contribuire a garantire una corretta somministrazione della terapia auricolare e oftalmica.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente IO si applica in tutte le Unità Assistenziali dell'A.O. Papa Giovanni XXIII.

3. TERMINOLOGIA

CI	Coordinatore Infermieristico
CO	Coordinatore Ostetrico
Inf	Infermiere
IO	Istruzione Operativa
OSS	operatore sociosanitario
Ost	ostetrica
USC	unità strutturale complessa

4. RESPONSABILITÀ

L'OSS agisce in collaborazione avvalendosi dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale infermieristico.

Ogni singolo operatore ha la responsabilità di collaborare all'applicazione della presente IO.
Il CI/CO è responsabile della verifica della sua corretta applicazione.

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Operatori coinvolti	OSS
Materiale occorrente	Farmaco prescritto consegnato dall'Inf Cotone o garza non sterile Guanti non sterili
Preparazione dell'operatore	Igiene delle mani Utilizzo di guanti non sterili
Preparazione dell'ambiente	Verificare adeguate condizioni ambientali
Preparazione della persona assistita alla terapia auricolare	Identificare la persona assistita secondo procedura aziendale Informare la persona assistita della procedura Farla posizionare in posizione supina e con il capo ruotato in modo che l'orecchio interessato alla somministrazione sia in posizione favorevole a contenere il farmaco
Sequenza degli atti	Tenere il farmaco qualche minuto tra le mani per riscaldarlo Riempire il contagocce con il farmaco Afferrare con due dita il margine superiore esterno del padiglione auricolare e tirarlo verso l'alto e verso l'esterno per allineare il canale auricolare Instillare la quantità di gocce prescritte mantenendo la mano dominante appoggiata in sede temporale per

	<p>evitare di ledere l'orecchio con il contagocce in caso di movimenti improvvisi Far mantenere alla persona assistita la posizione per qualche minuto Tamponare eventuale residui di farmaco con cotone o garza Rimuovere guanti non sterili Igienizzare le mani Registrare l'avvenuta terapia Riferire all'Inf eventuali alterazioni (rossore, secrezioni, dolore) rilevate durante la somministrazione.</p>
<u>Preparazione della persona assistita alla terapia oftalmica</u>	<p>Informare la persona assistita della procedura Far posizionare la persona assistita in posizione semi-seduta o supina.</p>
<p>Sequenza degli atti <u>Applicazione pomate oculari</u></p>	<p>Verificare la prescrizione Scostare, con delicatezza, il margine ciliare inferiore delle palpebre Invitare la persona assistita a volgere lo sguardo verso l'alto, applicare la quantità prescritta partendo dall'interno verso l'esterno tenendo la mano appoggiata alla fronte Invitare la persona assistita a chiudere gli occhi e muoverli verso destra e sinistra per permettere un'omogenea distribuzione del farmaco sulla superficie oculare Tamponare eventuale residui di farmaco con garza Rimuovere guanti non sterili Igienizzare le mani Registrare l'avvenuta somministrazione della terapia Riferire all'Inf eventuali alterazioni (rossore, secrezioni, dolore) rilevate durante la somministrazione.</p>
<p>Sequenza degli atti <u>Applicazione collirio</u></p>	<p>Se la persona assistita è seduta chiedere di inclinare la testa all'indietro e guardare verso l'alto, se supina chiedere di volgere lo sguardo verso l'alto Aspirare con il contagocce la quantità di collirio da instillare Invitare la persona assistita a non sbattere le palpebre per quanto possibile Porre la punta del contagocce a circa 1 o 2 centimetri sopra il bulbo oculare, per evitare il contatto diretto, appoggiando la mano che lo sostiene sulla fronte della persona assistita, facendo attenzione ad eventuali movimenti involontari della stessa Tirare delicatamente verso il basso il bordo palpebrale inferiore per scoprire il sacco congiuntivale Instillare il numero di gocce prescritte nel centro del sacco congiuntivale Invitare la persona assistita a chiudere gli occhi e muoverli verso destra e sinistra per permettere un'omogenea distribuzione del farmaco sulla</p>

	<p>superficie oculare Tamponare eventuale residui di farmaco con garza Rimuovere guanti non sterili Igienizzare le mani Registrare l'avvenuta somministrazione della terapia Riferire all'inf. eventuali alterazioni (rossore, secrezioni, dolore) rilevate durante la somministrazione.</p>
Riordino del materiale	<p>Allontanare il materiale monouso nei contenitori per rifiuti secondo indicazioni aziendali Riporre il farmaco in frigorifero Igiene delle mani</p>

6. RIFERIMENTI

DGR Regione Lombardia 06 Luglio 2001

DM 739/ 94 DM 739/94 Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere

Delibera della Giunta Regionale Lombardia n.VII/5428 DL 6 Luglio 2001-individuazione della figura e del profilo dell'OSS.

Codice Deontologico per infermieri Federazione Nazionale Collegio IPASVI Febbraio 2009

P. Casson, A.Cavicchioli, M. Morelli, A.Pomes, F. Zanella. "Manuale per l'Operatore Socio Sanitario. Principi e tecniche".Casa Editrice Ambrosiana, Milano, Dicembre 2001

IODiPSI08 "Prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero"

All1IODiPSI08 "L'igiene delle mani"

IO02PSp01PG23MQ7 "Come Lavarsi le Mani"

IO03PSp01PG23MQ7 "Come frizionare le mani con soluzione alcolica"

PspDPSDMP04 "La corretta identificazione del paziente"