

HCV FARMACI PER IL TRATTAMENTO Nome commerciale (principio attivo)	DOSE GIORNALIERA	COSTO IVA INCLUSA 12 settimane di trattamento (in euro)	ALCUNE PRINCIPALI NOTE
COPEGUS (Ribavirina) 200mg compressa rivestita COPEGUS (Ribavirina) 400mg compressa rivestita NB. Sempre in associazione	1.000mg pz=<75Kg 1.200mg pz=>75Kg da assumere in 2 dosi frazionate	161,7 pz=<75Kg 194,04 pz=>75Kg	Assumere a stomaco pieno. IR: aggiustamento dosaggio proporzionale alla clearance
<b>INIBITORE PAN-GENOTIPICO DELL'RNA POLIMERASI (NS5B)</b> *SOVALDI (Sofosbuvir) 400mg compressa rivestita NB. In associazione a ribavirina +/- peginterferone alfa <b>Scheda monitoraggio web (Registro AIFA)</b>	400 mg x1	40.699,99	Assumere con il cibo. IR: non richiesto aggiustamento di dose. I medicinali che sono <b>potenti induttori</b> della glicoproteina P(P-gp) (ad es. rifampicina, iperico, carbamazepina e fenitoina) possono ridurre in misura significativa la concentrazione plasmatica di sofosbuvir, con conseguente ridotto effetto terapeutico di Sovaldi; questi medicinali non devono essere utilizzati con Sovaldi.
<b>INIBITORE SPECIFICO DELLA SERINA PROTEASI (NS3/4A)</b> OLYSIO (Simeprevir) 150mg capsula rigida NB. In associazione a ribavirina e peginterferone. In associazione a Sofosbuvir +/-Ribavirina. <b>Scheda monitoraggio web (Registro AIFA)</b>	150mg x1	19.799,99	Assumere con il cibo. IR non richiesto aggiustamento di dose. La co-somministrazione con <b>inibitori moderati o potenti</b> di CYP3A4 può aumentare significativamente l'esposizione plasmatica a simeprevir, mentre la co-somministrazione con <b>induttori moderati o potenti</b> di CYP3A4 può ridurre significativamente l'esposizione plasmatica a simeprevir. Di conseguenza, la somministrazione in concomitanza con sostanze dotate di un'azione moderata o potente di inibizione o induzione di CYP3A4 non è raccomandata.
<b>INIBITORE PROTEINA NON STRUTTURALE 5A (NS5A)</b> DAKLINZA (Daclatasvir) 60mg compressa rivestita NB. In associazione a Ribavirina + Peginterferone alfa. In associazione a Sofosbuvir +/-Ribavirina. <b>Scheda monitoraggio web (Registro AIFA)</b>	60mg x1	18.699,98	Assumere con o senza cibo. IR non richiesto aggiustamento di dose. <u>Dose ridotta a 30mg</u> se somministrato con <b>inibitori potenti</b> di P450 3A4 (es.telaprevir; atazanavir/ritonavir; cobicistat; claritromicina; ketoconazolo). <u>Dose aumentata a 90mg</u> se somministrato con <b>induttori moderati</b> di P450 3A4 (es.efavirenz). Controindicato l'uso con <b>induttori potenti</b> di P450 3A4 (es. carbamazepina, fenitoina, rifampicina, rifabutina, desametasone sistemico, hyperico ecc). In pazienti in trattamento con <b>amiodarone</b> e Daklinza (daclatasvir) in combinazione con Sovaldi sono stati segnalati casi di bradicardia grave e blocco cardiaco.
<b>INIBITORE NS5A + INIBITORE NS5B</b> *HARVONI (Ledipasvir 90mg+sofosbuvir 400mg) compressa NB. +/- Ribavirina. <b>Scheda monitoraggio web (Registro AIFA)</b>	(90mg+400mg) x1	44.770,0	Assumere una volta al giorno con o senza il cibo. L'assorbimento di ledipasvir è pH-dipendente; è necessario lasciare trascorrere almeno quattro ore tra la somministrazione di Harvoni e quella di antiacidi. A digiuno gli inibitori di pompa protonica alle dosi abituali possono essere assunti contemporaneamente a Ledipasvir. Gli antagonisti dei recettori H2 alle dosi abituali e Ledipasvir possono essere assunti contemporaneamente o a distanza di 12h. I medicinali che sono <b>potenti induttori</b> di P-gp (es.rifampicina, hyperico, carbamazepina, fenitoina) possono ridurre le concentrazioni di Ledispavir/Sofosbuvir con conseguente possibile riduzione dell'effetto terapeutico di Harvoni, pertanto non devono essere co-somministrati. In pazienti in trattamento con <b>amiodarone</b> e Harvoni sono stati segnalati casi di bradicardia grave e blocco cardiaco.
<b>INIBITORE NS5A + INIBITORE NS3/4A + BOOSTER</b> *VIEKIRAX (Ombitasvir 12,5mg+Paritaprevir 75mg+Ritonavir 50mg) NB. In associazione +/- EXVIERA (Dasabuvir) +/- Ribavirina <b>Scheda monitoraggio web (Registro AIFA)</b>	(25mg+150mg+100mg) x1	27.324,00	Assumere 2 compresse la mattina con il cibo. IR: non richiesto aggiustamento di dose. Ritonavir è un <b>inibitore forte</b> del CYP3A, la co-somministrazione di Viekirax c/senza dasabuvir di medicinali metabolizzati dal CYP3A4 può condurre a un incremento delle concentrazioni plasmatiche di tali medicinali. Si prevede che la co-somministrazione di Viekirax con o senza dasabuvir con medicinali che sono <b>induttori</b> enzimatici forti o moderati riduca le concentrazioni plasmatiche di ombitasvir, paritaprevir e ritonavir e il loro effetto terapeutico; tale co-somministrazione deve essere evitata.
<b>INIBITORE NS5B</b> *EXVIERA (Dasabuvir) 250mg NB. In associazione a VIEKIRAX +/-Ribavirina. <b>Scheda monitoraggio web (Registro AIFA)</b>	250mg x2	2.375,99	Assumere con il cibo. IR: non richiesto aggiustamento di dose.
<b>COSTO IVA inclusa HPG23 al maggio 2015</b>		<b>F.Maggiolo (USC Malattie Infettive) D.Valsecchi (USC Farmacia)</b>	
*Per le terapie con durata di trattamento superiore alle 12 settimane, e che soddisfano i criteri di rimborsabilità definiti nel registro AIFA, viene riconosciuto un "payback"/nota di credito che riconduce il costo della terapia a quello della terapia di 12 settimane. I costi potrebbero subire ulteriori riduzioni legate al raggiungimento di un numero di trattamenti definiti secondo quanto concordato in sede negoziale con AIFA.			